

新型コロナワクチンを接種された方へ

～接種後の注意事項について～

接種後 **15分以上**、接種を受けた接種会場の施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合は、医師や看護師へお知らせください。

※過去に重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたことがある方は **30分以上**



アナフィラキシーについて

ワクチン接種直後から、時には5分以内、通常30分以内に、以下の症状が現れた場合、ショック、アナフィラキシーの疑いがあります

皮膚症状	消化器症状	視覚症状	呼吸器症状	ショック症状
皮膚のかゆみ じんま疹 紅斑 皮膚の発赤	腹痛 吐き気	視覚の異常	声のかすれ くしゃみ のどのかゆみ 息苦しさ	蒼白 意識混濁

起こるかもしれない体の症状

(接種を受けた方の10%以上に起こったもの)

下記のような症状は、**通常、数日以内に治ります。**

解熱消炎鎮痛剤などを使用される場合は、主治医、薬剤師に服用についてご相談ください。

	痛み	腫れ	頭痛	下痢	筋肉痛	関節痛	疲労	悪寒	発熱
症状									
発現割合	84.3%	10.6%	55.1%	15.5%	37.9%	23.7%	62.9%	32.4%	14.8%
発症時期	接種当日		接種翌日						
持続期間	約2日		約1日						

これらの症状の多くは1回目の接種よりも2回目の接種時に高い頻度で認められました。また、高齢者よりも非高齢者に高い頻度で認められました。

接種後、会場内での待機中にこれらの症状がみられた場合は、**すぐに、接種会場の医師、看護師等に伝えてください。**帰宅後に、上記症状がみられた場合は、**かかりつけ医や県のコールセンター等にご相談ください。**



本日1回目の接種を受けた方へ

1回目接種



3週間後

2回目接種



新型コロナワクチンは1回目の接種後、3週間の間隔で2回目の接種を受ける必要があります。

2回目のワクチン接種の予約方法は、お住まいの市町村で異なりますので市町村からの案内やホームページなどでご確認をお願いします。

※1回目の接種から3週間を超えた場合には、できる限り速やかに2回目の接種を受けてください。

ワクチンを接種してからの過ごし方

			
接種後もマスクの着用、三密の回避、咳エチケットを守りましょう。	入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしましょう。	当日の激しい運動は控えましょう。	体調に異常を感じた時は、医師やコールセンター等にご相談ください。

新型コロナワクチン接種に関する注意喚起

ワクチン接種は無料です。

市町村等がワクチン接種のために金銭や個人情報を電話やメールで求めることはありません。



宮崎県新型コロナワクチン副反応等コールセンター

電話：0985-26-4609 FAX：0985-26-1000

メール：fukuhannocall-miyazaki@pref.miyazaki.lg.jp

受付時間 午前9時～午後8時（土日、祝日を含む）