

宮新ワ第85号
令和3年6月22日

個別接種実施医療機関 各位

宮崎市長 戸敷 正
(公印省略)

新型コロナウイルスワクチンの間違い接種の防止について（通知）

時下 ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。

平素より、本市の予防接種行政にご尽力とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

令和3年6月16日付け「予防接種における間違い接種の発生について」において改めて間違い接種の発生防止対策の徹底と発生した場合の速やかな報告についてお願いしたところです。

今後、下記のような事案が発生した場合は、間違い接種に該当するため、被接種者に対し速やかに適切な説明と処置を講じるとともに、直ちに当市へご報告いただきますようお願い申し上げます。

なお別添のとおり、「間違い防止チェックリスト」を作成いたしましたので、ご活用ください。

記

<間違い接種の例>

- ・ 誤った用法用量で接種
- ・ 有効期限の切れたワクチンの接種
- ・ 血液感染を起こしうる接種
- ・ 1回目の接種後、18日以上の間隔をおいていない2回目の接種
- ・ 他の予防接種を実施後、13日以上の間隔をおいていない接種
- ・ 他の予防接種を同時に行った接種
- ・ 間違った部位への接種
- ・ 定められた回数以上の接種
- ・ 不適切な管理状態にあったワクチンを使用した接種 等

【文書取扱】

宮崎市新型コロナウイルスワクチン対策局
TEL:0985-73-8100
FAX:0985-73-8230

予防接種を適切に実施するための間違い防止チェックリスト


1. 問診時の確認事項

- 1) **氏名、生年月日**を声に出して述べてもらい、予診票を見ながら本人確認する。
- 2) 対象者がワクチンの対象接種年齢であるか確認する。
- 3) ワクチンの**種類と接種回数**を確認する。
- 4) 前回の予防接種実施日からの**接種間隔**を確認する。
→1回目の接種から3週間（接種日を0とし、翌日から数えて20日間）以上、間隔が空いていることを確認。

2. 接種時の注意事項

- 1) 注射器のワクチンの量が**0.3ml**であることを確認する。
- 2) 接種する部位を確認する。
原則上腕外側三角筋中央部で、一般的に成人では肩峰から3横指下に筋肉注射を実施する。接種する際は**被接種者は手を腰に当てない**。

① 肩峰を確認してください



筋肉注射の手技

② 3横指 位置をずらしてください

(参考：日本医師会新型コロナワクチン速報 第5号)

3. 接種後の注意事項

- 1) 手に持っている使用済み注射器は、リキャップ等せず、**直ちに針捨てボックスに廃棄**する。

